


Lane Medical Library
Aus der Universitäts-Frauenklinik Erlangen.
Direktor: Prof. Dr. med. et phil. H. Wintz.



Über die krebsdiagnostische Ver- wertbarkeit des Hämatin-Verzugs.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Hanns Sametschek

aus Erlangen.

Tag der mündlichen Prüfung: 25. Juni 1937.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1937

Dekan: Professor Dr. Greving.
Referent: Professor Dr. Wintz.

Zwei Tendenzen waren es auf dem Gebiet der Krebsforschung, die im letzten Jahrzehnt auf der einen Seite Forscher und Ärzte zu immer neuer und zäher Arbeit anhielten, und auf der anderen das interessierte Laienpublikum in ständiger Spannung und Hoffnung leben ließen: der Gedanke an die unblutige (interne) Behandlung des Carcinoms und die frühzeitige Erkennung dieses Leidens. Während die Öffentlichkeit, die von der ärztlichen Wissenschaft — man möchte fast sagen täglich — das universelle Krebsmittel erwartete, durch die vielen Enttäuschungen allmählich abgestumpft wurde, war sich die nüchtern denkende Forschung darüber klar, daß abgesehen von einzelnen Zufallserfolgen, ein wirklicher Fortschritt in der Krebsbehandlung nur auf dem Weg über die Frühdiagnose erzielt werden könne. Die Resultate der in dieser Richtung gehenden Kleinarbeit sehen wir heute in den verschiedenen krebsdiagnostischen Methoden. Die Grundlage dafür bildete fast ausschließlich das Blutserum des Krebskranken und die Carcinomzelle selbst. Lesen wir im Schrifttum nach, so finden sich vornehmlich die physikochemischen- und die Färbemethoden, die Fällungs- und Trübungsreaktionen, die Komplementbindungs-, die zytolytischen, die Ferment- und schließlich die Cutanreaktionen. Unter ihnen hervorragend die Kahn'sche Methode mit einer Trefferzahl von etwa 87% und die Fuchs'sche Reaktion mit richtigen Resultaten bis zu 94%. Neben den Hautreaktionen gab es eine einzige Methode, die von den bisherigen Untersuchungsgrundlagen abweichend einen neuen Weg beschritt, nämlich die Indophenolblau-Sauerstoffreaktion nach Sehart.

Als Grundlage dienten Sehart die Untersuchungen Otto Warburg's, der feststellte, daß die Krebszellen, wie auch das fetale Zellgewebe, unter einer Erstickungsatmung stehen. Daraus war zu folgern, daß bei Vorliegen einer dieser beiden Körperzustände im Venenblut ein Mehr an Sauerstoff vorhanden sein mußte, da ja der herbeigeschaffte Sauerstoff aus irgendwelchen Gründen von diesen Zellkomplexen nicht im sonstigen Maße verbraucht wurde. Diese Tatsache war bekannt. Während man aber bisher nur den aktivierten Sauerstoff des Zellkörnchens im Ge-

frierschnitt mit der Oxydationsreaktion nachweisen konnte, ist es das Verdienst Sehrts, den ans Hämoglobin gebundenen molekularen Sauerstoff (der eben, wie oben erwähnt, bei den zwei pathologischen und physiologischen Zuständen des Organismus vermehrt vorhanden ist) durch seine Indophenolblau-Sauerstoffreaktion erkennbar gemacht und in seiner Größe erfaßt zu haben. Es ist hier nicht der Ort, auf diese relativ einfache und schnell durchführbare Reaktion näher einzugehen, als es zum Verständnis des Hämatin-Verzugs nötig ist. Sehart stellte gemeinsam mit Michaelis in seinen Untersuchungen mit der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion fest, daß bei Normalen (Carcinomfreien und Nichtgraviden) einer gewissen Hämoglobinzahl im Venenblut immer ein konstanter Wert (abgesehen von einer ganz geringen, stets mitbeachteten Fehlerbreite) der Indophenolblau-Bildung im Venenblut parallel ging, während bei Krebskranken und Schwangeren eine wesentliche Mehrblaubildung nach einer Dreiviertelstunde beobachtet wurde. Da nach dieser Zeit auch der Wert des Hämoglobins, bzw. des salzsauren Hämatins, im Autenrieth-Königsberger'schen Hämoglobinometer kontrolliert wurde, beobachtete man gleichzeitig, daß im Blut der Krebskranken bzw. Gravidan regelmäßig ein Verzug in der Hämatinbildung auftrat. Bei der weiteren Untersuchung dieser Tatsache trat hier ein Phänomen — der Hämatin-Verzug — zutage, das, zunächst nur die Ergebnisse der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion sichernd, neben dieser betrieben wurde, dann aber, sich immer eindeutiger herausstellend, auch als selbständiges Krebs-Diagnostikum gewertet werden konnte. Sehart erklärt das bisherige Unbekanntsein dieser Erscheinung damit, daß man eigentlich keinen besonderen Anlaß sah, den Vorgang bei der Nachdunkelung des Blutfarbstoffes genauer zu beobachten.

Das Phänomen des Hämatin-Verzugs tritt folgendermaßen in Erscheinung. Schon Autenrieth hatte eine Nachdunkelung in einer Blutauflschwemmung festgestellt, die beim Normalen im Verlauf von 2 Stunden einer Zahl von durchschnittlich 8 Sahli-Prozenteinheiten entsprach. Sehart untersuchte eine salzsaure Hämatin-Suspension 5 Minuten nach der Vermischung im Autenrieth-Königsberger'schen Hämoglobinometer (dieser Apparat wurde bei all seinen Nachprüfungen als Untersuchungsgrundlage

benützt). Die nächste Ableseung am Colorimeter wurde in der 47. Minute und die dritte 2 Stunden nach Vermischung vorgenommen. Lag beim Normalen ein Anfangswert von etwa 70% (nach Sahli) vor, so dunkelte diese Blutausschwemmung bis zur 47. Minute bis ungefähr 74—78% nach, während sich der 2-Stunden-Wert abermals um einige Prozent erhöhte. Dies stellten Sehart und Michaelis bei mehreren hundert Gesunden und Krebsfreien (abgesehen von einem gewissen Prozentsatz Fehler, von denen später ausführlich die Rede sein wird) unter Beweis. Ganz anders waren nun die Werte im Blut von Krebskranken und Schwangeren. Betrug die Ableseung 5 Minuten nach Vermischung wieder 70%, so fand sich nach der 47. Minute eine Nachdunkelung bis höchstens 72 oder 73%. Auch nach 2 Stunden war keine wesentlich höhere Zahl erreicht. Sehart nimmt auf Grund seiner reichen Erfahrungen als Grenze für den positiven Ausfall der Reaktion (also Auftreten einer verzögerten Hämatinbildung) einen Nachdunkelungswert bis zu 3% (Ableseung nach der 47. Minute) an.

Für die Überprüfung des Phänomens des Hämatin-Verzuges macht Sehart, kurz gefaßt, folgende Angaben: Untersucht wird mit dem Autenrieth-Königsberger'schen Hämoglobinometer, das von der Firma Hellige, Freiburg, hergestellt wird. Aus der möglichst kurz gestauten Armvene der entsprechend vorbehandelten Person wird dunkel (nicht hellrot) fließendes Venenblut entnommen, rasch 4 Mißpipetten bis zur 20 cmm-Marke aufgezogen und bis zur Marke 2 ccm mit n/10 Salzsäure aufgefüllt und mit der Glasperle in der Pipette kräftig durchgeschüttelt. Nach genau 5 Minuten wird die Suspension im Colorimeter „mit einer optisch gleichwertigen, in einem Glaskeil befindlichen, sehr lange haltbaren Flüssigkeit“ (Sehart) in der oben angegebenen Weise verglichen. Die Übertragung der am Hämoglobinometer abgelesenen Zahlen in Sahli-Einheiten, die durch Sehart von Anfang an als Basiseinheit festgelegt wurden, geschieht nach einer von Autenrieth vorgeschlagenen Umrechnung (beruhend auf der Tatsache, daß sich in 100 ccm Venenblut etwa 17 g Oxyhämoglobin befinden), die von der Firma Hellige & Co. modifiziert beibehalten wurde.

Im November 1935 wurde ich von Herrn Professor Wintz

beauftragt, das Phänomen des Hämatin-Verzugs am Material der Erlanger Frauenklinik nachzuprüfen, was ich mit vielmonatigen Unterbrechungen — wegen Abwesenheit von der Klinik — bis heute durchführte. Ich hielt mich dabei genauestens an die Vorschriften Sehrt's und verzichtete lediglich nach einigen Monaten auf die Nachprüfung des 2-Stunden-Wertes, da ich feststellen konnte, daß sich die Nachdunkelung nach dieser Zeit nahezu immer entsprechend dem Dreiviertelstunden-Wert entwickelte. Die Beurteilung der Fälle in vorliegender Arbeit ist also immer nach dem Nachdunkelungswert in der 47. Minute geschehen. Auch Sehrt betont in seiner letzten Veröffentlichung in der Münchener Medizinischen Wochenschrift 1935, S. 2074 den 2-Stunden-Wert nicht mehr, und spricht nur noch von einer Ablesung bei der 47. Minute oder nach einer Stunde.

Wie bei der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion stellte Sehrt im Laufe seiner Untersuchungen mit dem Hämatin-Verzug fest, daß eine Reihe von Begleitumständen den Ausfall der Reaktion beeinflussten, daher als Störfaktoren gewertet und vor Anstellen der Blutuntersuchung ausgeschaltet werden mußten. Dadurch steigt die Verlässlichkeit der Probe, während sie allerdings an Anwendungsbreite etwas einbüßt, was aber leicht in Kauf genommen werden kann. Immerhin gingen mir viele Fälle dadurch verloren, daß z. B. die in die Klinik aufgenommenen krebskranken Patientinnen zum Teil schon am nächsten Morgen einer Röntgentiefenbestrahlung unterzogen wurden und daher gut abgeführt sein mußten. Sehrt's Forderungen zur Ausschaltung der Störfaktoren seien hier mit seinen eigenen Worten angeführt: „Bei Verdacht auf Krebs darf der Kranke weder voroperiert noch vorbestrahlt sein, in der Nacht vor der Untersuchung darf keine erhebliche Wasserentziehung des Organismus durch Darmkatarrh oder Abführmittel erfolgt sein, rektal soll die Temperatur 37,8° keinesfalls übersteigen, seit 12 Stunden muß der Kranke nüchtern sein und vor 2 Stunden 20 Insulineinheiten subkutan erhalten haben. Bei der Entnahme aus der Vene darf das Blut nicht hellrot abfließen, zur Bestimmung darf nur das ganz dunkel abfließende Venenblut benutzt werden“. — Übrigens Postulate, die in manchen Punkten auch bei verschiedenen Laboratoriums-Untersuchungen, besonders aber bei anderen Tumorreaktionen gestellt wurden.

Unter meinen 209 Blutuntersuchungen finden sich 26 Fälle, die ich nach Sehrt's Angaben als Störer bezeichnen kann. Sie sind in das Gesamtergebnis nicht eingerechnet, gleichgültig, ob ihr Ergebnis mit der klinischen Diagnose übereinstimmte oder nicht. Eine Berechtigung dazu besteht zweifelsohne, da sich ihr störender Einfluß immer wieder geltend machte. Ich habe, vornehmlich zu Beginn meiner Untersuchungen, auch derartige — nach Sehrt von vornherein als gestört zu betrachtende — Blutproben untersucht, um mir auch davon ein Bild machen zu können. Besonders auffallend war dabei die Tatsache, daß eine starke Wasserentziehung des Organismus durch Laxantien in jedem Fall den entsprechenden Ablauf der Hämatinbildung störend beeinflusste. Da unsere krebserkrankten Patientinnen mehrere Tage vor der Röntgentiefenbestrahlung gut abgeführt werden, hatte ich häufig Gelegenheit dies zu beobachten. So sind von meinen 26 Störfällen allein 20 aus diesem Grund entstanden. Bei allen lag ein einwandfreies, nicht in Rückbildung begriffenes Carcinom (15 Portio-Ca., 2 Mamma-Ca. und je 1 Vulva-, Cervix-, Corpus- und Ovarial-Ca.) vor, das nach aller Erfahrung als sicheren Krebswert einen Hämatin-Verzug unter der Nachdunkelungsgrenze von 3% hätte geben müssen. In diesen Fällen betrug aber die Nachdunkelung im Durchschnitt 4,9 %. Bei rektal gemessenen Temperaturen über 38° waren 2 Fälle (1 Portio- und 1 Ovarial-Ca.) untersucht worden und ebensoviele mit auffallend rot abfließendem Venenblut (1 Portio- und 1 Ovarial-Ca.). 2 weitere Carcinome (1 Ovarial- und 1 Corpus-Ca.) ergaben am Tage nach einer vorgenommenen Abrasio in Evipanarkose (!) eine auffallend hohe Nachdunkelung der Hämatinjuspension. Auf das 12-stündige Nüchternbleiben der zu Untersuchenden wurde streng geachtet. Wie weit die fehlende Vorbehandlung mit Insulin stört, kann ich nicht beurteilen, da bis auf einige Fälle überall zwischen 10 und 20 E. gegeben wurden. Diese wenigen ohne Insulin untersuchten krebserkrankten Patientinnen ergaben in jedem Fall die entsprechenden Werte unter 3 %.

In einem Punkt konnte ich jedoch von den Sehrt'schen Angaben abweichende Feststellungen machen, nämlich beim Hämatin-Verzug nach vorherigen Röntgenbestrahlungen. Da es sich aber nur um 8 Fälle handelt, kann hiermit noch nichts Endgültiges

ausgesagt werden. In 1 Fall trat außerdem ein negatives Ergebnis auf. Immerhin ist das Vorhandensein des Hämatin-Verzugs in den übrigen 8 Fällen so eindeutig, daß ich hier die Ergebnisse bei diesen Kranken anführen möchte:

1. Nr. 127 Frau A. Tr. (Cervix-Ca) H. V. v. 18. 5. 36 2,8%
Einige Stunden nach dem Vulvafeld
2. Nr. 10 Frau A. B. (Portio-Ca) H. V. v. 3. 8. 36 1,4%
2 Tage nach dem Vulvafeld
3. Nr. 58 Frau L. H. (Portio-Ca) H. V. v. 11. 12. 35 1,7%
n. 2 Std. 3,7%
H. V. v. 22. 2. 36 2,2%
n. 2 Std. 3,8%
Am 20. u. 21. 2. 36 Rö. Bestr. d. Param.!
4. Nr. 99 Frau K. R. (Portio-Ca) H. V. v. 13. 1. 36 2 0%
n. 2 Std. 2,9%
H. V. v. 25. 2. 36 2,2%
n. 2 Std. 4 0%
Am 24. u. 25. 2. 36 war die Rö. Tiefen-
bestrahlg. der Param. durchgeführt
worden!
5. Nr. 45 Frau B. H. (Portio-Va- H. V. v. 12. 5. 36 2 0%
gina-Ca) n. 2 Std. 3,6%
H. V. v. 15. 5. 36 1,7%
n. 2 Std. 4,7%
Am 12., 13. u. 14. 5. 36 Rö. Bestr. der
Parametrien!
6. Nr. 3b Frau A. A. (Ovarial-Ca) H. V. v. 9. 6. 37 0,5%
H. V. v. 15. 6. 37 1,6%
Am 11., 12. u. 13. 6. 37 primäre Rö. Bestr.
7. Nr. 19 Frau E. B. (Malign. Tumor i. kleinen Beckern
Klin. Ca!) H. V. v. 3. 8. 36 2,8%
H. V. v. 7. 8. 36 1,6%
Am 3., 4. u. 5. 8. 36 prim. Rö. Bestr.
8. Nr. 77a Frau J. M. (Portio-Ca) H. V. v. 15. 6. 37 0,4%
H. V. v. 17. 6. 37 1 0%
Am 15. u. 16. 6. 37 primäre Rö. Bestr.

1 Fall mit negativem H. V. bei Ca:

9. Nr. 131 Frau K. V. (Portio-Ca) H. V. v. 25. 6. 36 1,8%
n. 2 Std. 3 %

H. V. v. 30. 6. 36 4,2%
n. 2 Std. 4,8%

Am 27. u. 28. 6. 36 primäre RÖ. Bestr.!

Neben 8-maligem Vorhandensein eines Hämatin-Verzugs nach Röntgenbestrahlung ein einziges negatives Ergebnis. Was liegt also näher, als diesen einen negativen Hämatin-Verzug durch irgendeine andere Ursache zu erklären. Im übrigen entspricht der Hämatin-Wert nach der Bestrahlung ungefähr dem vorherigen. In 3 Fällen eine geringe Steigerung im Vergleich zur Hämatin-Größe vor der Bestrahlung, bei 2 Kontrollen sogar eine Abnahme des Hämatin-Verzugs. Von einer Spätwirkung der Röntgenbestrahlung, wie sie etwa Klein für seine Tumorreaktion angab, kann nicht die Rede sein, da ja ein großer Teil der vorliegenden Fälle 6--8 Wochen nach einer therapeutischen Bestrahlung untersucht wurde und positive Resultate ergab. Diese beschriebenen 9 Untersuchungen wurden wegen ihrer richtigen Ergebnisse auch nicht als Störer gewertet, sondern dem übrigen Gesamtergebnis zugerechnet (8 Treffer und 1 Fehler).

Zunächst möchte ich nun eine Übersichtstabelle der Gesamtergebnisse bringen. Nach Abzug der Störer und einiger Sonderfälle, die eigens behandelt werden sollen, liegen 175 Blutuntersuchungen auf das Phänomen des Hämatin-Verzugs vor. In der Tabelle I sind jedoch nur histologisch gesicherte Carcinome geführt und klinisch carcinomfreie Personen. Aus den Ergebnissen bei Carcinomkranken habe ich noch eine Reihe von Fällen abge sondert. Es sind dies Patientinnen, bei denen früher klinisch und pathologisch-anatomisch ein Carcinom vorlag, die aber jetzt zur Zeit der Anstellung des Hämatin-Verzugs (entweder bei der zweiten Röntgenbestrahlung oder bei einer der regelmäßigen Nachuntersuchungen in unserer Klinik), klinisch — d. h. nach der Anamnese, allgemeinem Körperzustand, örtlichem Befund und Blutbild — rezidivfrei waren. In all diesen Fällen wies auch der Hämatin-Verzug ein klares negatives Ergebnis auf.

Tabelle I.

Carcinom-Kranke 110		
	Treffer	Fehler
Absolute Zahlen	101	9
In Prozent	91,8	8,2
Rezidivfreie Ca-Kranke (nach Bestr.) 15		
	Treffer	Fehler
Absolute Zahlen	13	2
In Prozent	86,7	13,3
Ca-Freie 38		
	Treffer	Fehler
Absolute Zahlen	31	7
In Prozent	81,6	18,4

Tabelle II.
Zusammenstellung.

	Gesamtzahl	Fehler	Treffer in %
Ca-Kranke	110	9	91,8
Rezidivfreie Ca-Kranke (nach Bestrahlung)	15	2	86,7
Ca-Freie	38	7	81,6
Gesamtmaterial	163	18	86,7

Außerdem wurde der Hämatin-Verzug 12 mal angestellt bei 8 Fällen von klinisch sicherem Carcinom (nach Vorgeschichte, allgemeinem und örtlichem Befund, Blutbild und weiterem Verlauf), bei denen aber die Diagnose nicht pathologisch-anatomisch gesichert werden konnte. Das Resultat ergab 10 Treffer und 2 Fehler. Es handelte sich um: 1 Vulva-Ca.; 3 Ovarial-Tumoren; 1 Mediastinaltumor nach kurz vorher bestehendem (mit Erfolg Radium-bestrahlten) Cancroid der Ohrmuschel und vor Jahren erfolgreich operiertem und bestrahltem Ovarial-Ca.; 1 malignen Tumor im

kleinen Becken (2 mal stark positiver Hämatin-Verzug). Bei 1 Rectum-Ca. und 1 Ovarial-Ca. war der Hämatin-Verzug je einmal positiv und einmal negativ. Ich habe diese Ergebnisse, da nicht histologisch gesicherte Carcinome, nicht in das obige Gesamtergebnis eingerechnet.

Unter den 101 Carcinom-Kranken mit positivem Hämatin-Verzug befanden sich

- 75 Portio-Carcinome
- 7 Cervix-Carcinome
- 3 CorpusCarcinome
- 1 Vulva-Carcinom
- 4 Ovarial-Carcinome
- 2 Rectum-Carcinome
- 7 Mamma-Carcinome
- 2 mal Carcinom-Metastasen nach Cancroid.

Besonders zu bemerken ist in dieser Aufstellung, daß das Hauptkontingent von Portio-Ca., also Plattenepithel-Ca. gestellt wird (75,5%). Waren es doch gerade die Carcinome des Plattenepithels, bei denen andere Reaktionen (Fuchs) häufig versagten.

Als Durchschnitt der Nachdunkelung (nach der 47. Minute) ergab sich bei den vorliegenden Fällen der Wert 1,95% und für die Ableseung nach 2 Stunden (in 70 Fällen vorgenommen) 3,5%. In eindrucksvollem Gegensatz zu diesem 2 Stunden-Wert bei Ca-Kranken beträgt die durchschnittliche Nachdunkelung bei meinen 31 Ca-Freien mit negativem Hämatin-Verzug nach der 47. Minute bereits 5,03%! Übrigens besteht hier nahezu völlige Übereinstimmung zwischen den Durchschnittswerten, die Sehrt in einer seiner letzten Arbeiten über den Hämatin-Verzug angibt und den von mir errechneten. Bei Sehrt: 5% Nachdunkelung (nach 47 Minuten) beim Normalen und 1,97% beim Krebskranken.

Bei 9 Kranken trat, obwohl überall einwandfrei ein Carcinom vorlag, kein Hämatin-Verzug auf. Da fast alle diese Fälle im Anfang meiner Untersuchungen liegen, besteht immerhin die Möglichkeit, daß zumindest die Werte, die nahe an der Grenze zum Positiven liegen, durch die damals noch nicht so ausgebildete Technik im Vergleichen der Helligkeitsunterschiede der Farblösungen zustandekamen. Außerdem wurden damals die von

Sehrt angegebenen Störfaktoren noch nicht so genau beobachtet. Jedenfalls erhielt ich in letzter Zeit bei peinlicher Beachtung der Sehrt'schen Vorschriften und durch genauestes Untersuchen beim Vorliegen eines Carcinoms kein negatives Ergebnis mehr.

Bei den genannten 9 Kranken handelt es sich um folgende Fälle:

3 Mamma-Ca.: Alle 3 operiert, 2 vor 8 Wochen bei uns erstmalig bestrahlt, 1 Pat. kam zur ersten Bestrahlung. Bei allen war die Gegend um die Operationsnarbe rezidiv- und metastasenfrem, lediglich in den Claviculargruben oder axillar mäßige Drüsenvergrößerungen. Im Blutbild war die Senkung gering erhöht. Hämatin-Verzug betrug 4,5%, 3,5%, 3,5%.

4 Portio-Ca.: 2 waren vor 8 Wochen erstmalig, 1 vor 5 Monaten parametran bestrahlt worden. Alle 3 waren stark in Rückbildung begriffen. Hämatin-Verzug 4,3%, 6%, 7,3%. — 1 Portio-Ca. zeigte 2 Tage nach der Primärbebestrahlung einen Hämatin-Verzug von 4,2/4,8%. Vor der Bestrahlung noch 1,8 und 3%. (Schon bei den Störern angeführt).

1 Cervix-Portio-Ca.: Vor 8 Wochen 1. Bestrahlung. Hämatin-Verzug damals 2,4 und 4,8%. Jetzt ist das Ca. in Rückbildung begriffen. Hämatin-Verzug 4 und 4,4%.

1 Rectum-Ca.: Vor 8 Wochen 1. Bestrahlung. Hämatin-Verzug 3%. — Allgemeiner und örtlicher Befund hat sich bisher weitgehend gebessert; Hämatin-Verzug 4,2 und 5,2%.

Bei fast allen Kranken handelte es sich um bereits vorbestrahlte bzw. operierte Fälle, die auf Grund ihres klinischen Befundes stark in Rückbildung begriffen waren. Bei einigen zeigte der Hämatin-Verzug auch bei dem letzten Klinikaufenthalt klare positive Werte. So darf man vielleicht sogar annehmen, daß das Phänomen des Hämatin-Verzuges — also die Untersuchung des Blutfarbstoffes — den augenblicklichen Zustand des Organismus seine „Abwehrlage“, wiedergibt.

Zur weiteren Illustration dieser Vermutungen, wie auch zum Verständnis des folgenden Abschnitts über die untersuchten rezidivfreien Krebskranken, möchte ich einen in Abständen von mehreren Monaten 3 mal kontrollierten Fall genauer ausführen:

Nr. 47

Frau L. H. aus B., 40 J.

Diagnose: Unreifes Plattenepithel-Ca. der Portio.

1. Klinikaufnahme am 18. XI. 1935.

Anamnese: Vor 11 Wochen letzte normale Regel. Seit 7 Wochen ganz unregelmäßige Blutungen. Sonst o. B.

Befund: Mehrhöckeriger, derber Portiotumor, stark blutend. Parametrien frei.

Blutbild: Senkung 77 mm. Erythr. 3,9 Mill., Leukoz. 13000, Hämogl. 62%, Lymphoz. 30%, Polynukl. 68%, Eosinoph. und Monoz. 1%.

H. V. am 19. XI. 1935 2,9 %, nach 2 Std. 3,6 %.

Behandlung: Primäre Röntgenbestrahlung, Zusatzbestrahlung nach Chaoul.

2. Klinikaufnahme am 31. I. 1936.

Zwischenanamnese: Keine Blutung. Ganz geringer, weißlicher Ausfluß. Keinerlei Schmerzen. Appetit, Stuhlgang, Wasserlassen gut.

Befund: Portio noch etwas gerötet, Oberfläche glatt. Vord. Muttermundslippe links mit Kerbe. Parametrien frei. 5 Kg. Gewichtszunahme.

Blutbild: Senkung 16 mm. Hgl. 70%. Erythrozyt. 4,2 Mill., Leukoz. 7000, Lymphoz. 44%, Polynukl. 49%, Eosinoph. 7%.

H. V. am 3. II. 1936 6,6 %, nach 2 Std. 7,5 %.

Behandlung: Röntgenbestrahlung der Parametrien, Zusatzbestrahlung nach Chaoul.

3. Klinikaufnahme am 10. VIII. 1936.

Zwischenanamnese: Seit einigen Wochen wieder Blutungen. Reichlich gelblicher, stinkender Ausfluß. Kreuzschmerzen. Beim Stuhlgang Blutung aus der Vagina. Polyurie. Mattigkeit.

Befund: Portio tief, plump, höckerig formiert, derb, fixiert. Im Spiegel markstückgroßer, leicht blutender Portiotumor. Cervix derb aufge-

trieben. Linkes Parametrium derb, rechts verkürzt. 2 Kg. Gewichtsabnahme.

Blutbild: Senkung 90 mm. Hgl. 61%. Erythrozyt. 3,1 Mill.
Leukozyt. 23000, Lymphozyt. 12%, Polynukl. 84%,
Eosinoph. 3%, Monozyt. 1%.

H. V. am 13. VIII. 1936 1,5 %.

Behandlung: Radium-Applikation.

Der Hämatinverzug entspricht in diesem Fall ganz offensichtlich immer dem subjektiven Befinden der Patientin, wie auch dem augenblicklichen klinischen Befund.

Die gleiche Tatsache findet sich auch bei 14 anderen meiner untersuchten Fälle. Es handelt sich um Patientinnen, die wegen eines Carcinoms mit Röntgenlicht bestrahlt, sich bei einer neuerlichen Klinikaufnahme als klinisch (subjektives Befinden, Allgemeinzustand, Lokalbefund, Blutbild, evtl. weiterer Verlauf) sicher rezidiv- und metastasenfrees erwiesen. Von diesen zeigten 12 einen positiven Hämatinverzug, 2 Fälle dunkelten trotz Rezidivfreiheit über die Grenze von 3 % nach.

Bei den Treffern handelte es sich um 6 Portio-Ca., 5 Mamma-Ca. und 2 Corpus-Ca. Die 1. Bestrahlung lag bei ihnen zwischen 2 und 5 Monaten zurück. Die Röntgenbestrahlung eines Portio-Carcinoms war bereits vor 6 Jahren durchgeführt worden. Die Patientin war seitdem regelmäßig nachuntersucht worden und erwies sich auch jetzt klinisch, wie auch nach dem Hämatin-Verzug, als rezidivfrei. Die durchschnittliche Nachdunkelung des Hämatins beträgt bei diesen 12 Fällen 5 %, nach 2 Stunden 7 %.

Besonders zu beachten sind die 2 negativen Fälle.

Nr. 111. Portio-Ca. Röntgenbestrahlung im September und November 1934. Seitdem klinisch rezidiv- und metastasenfrees.

H. V. am 1. 4. 1936 nach der 47. Minute 1,7 %
nach 2 Stunden 2,7 %

Familienanamnese: Vater mit 72 J. an Magenkrebs gestorben.

Nr. 115. Mamma-Ca. Vor 2 Monaten 1. Röntgenbestrahlung und Exzision des Tumors. Jetzt klinisch rezidivfrei.

H. V. am 30. 4. 1936 nach der 47. Min. 2 %
nach 2 Stunden 2,6 %.

Familienanamnese: Großmutter an Unterleibskrebs gestorben.

Bei beiden also, trotz dem nach klinischen Untersuchungsmöglichkeiten nicht mehr vorhandenen Krebs, eindeutig positive Werte beim Hämatin-Verzug.

Gleichzeitig muß bei diesen 2 Kranken der angegebene Krebs in der Familienanamnese auffallen. So sind wohl auch diese 2 Fälle ein Beitrag zu einem Punkt, der später noch ausführlicher zu besprechen ist, nämlich dem positiven Ausfall der Krebsreaktionen — hier dem Hämatin-Verzug — beim Normalen. Was liegt näher, als auch in unseren Fällen an die Vererbungs- tendenz der Krebskrankheit zu denken. Und die Schlußfolge- ung: Die Carcinom-Disposition lag hier im Organismus vor und kam bei beiden im Alter von 50 Jahren örtlich zum Aus- druck. Durch die Behandlung wurden die lokalen Tumoren be- seitigt, aber die Krebsdisposition schlummert weiterhin im Körper.

Unter den 31 Carcinom-freien Fällen finden sich die ver- schiedensten gynäkologischen und anderen Kranken; auch einige Gesunde:

Klimakterische Metrorrhagien	4
Apoplexia uteri	3
Uterus myomatosus	3
Parametritis	3
Pseudoerosion der Portio	3
Portio-Erosion	2
Operierte Ovarial-Cyste	1
Ovarial-Tumor (klinisch sicher kein Ca!)	1
Innersekretorische Störungen, Sterilität	1
Cystenmamma	1
Coccygodynie	1
Verwachsungsbeschwerden nach Magenresektion	1
Halsdrüsen-Tuberkulose	2
Kein pathologischer Befund	5

Die durchschnittliche Nachdunkelung bei diesen 31 Blutpro- ben betrug nach der 47. Minute 5%, wie schon oben erwähnt, die gleiche Zahl, die Sehrt aus mehreren hundert Fällen errech- ete. Für die Ableseung nach der 2. Stunde erhielt ich als Durchschnittswert 7,9%.

Neben diesen 31 Treffern finden sich 7 Kranke ohne nachweisbares Carcinom, die im Blut einen klaren positiven Hämatin-Verzug aufweisen. Es handelt sich um folgende Fälle:

3a) Frau M. A., 28 J.

Diagnose: Appendix-Verwachsungen. Douglascyste (operiert).

Im Befund kein Anhalt für Ca.

H. V. am 5. IV. 1937: 1,8 %.

In der Familie angeblich kein Ca.

5a) Frä. M. A., 30 J.

Diagnose: Adnexitis-Parametritis.

Für Ca. kein Anhalt.

H. V. am 16. VI. 1936: 1,9 %.

Vater mit 57 J. an Magen-Ca. gest.

63) Frau W. K., 59 J.

Diagnose: Pseudoerosion der Portio (histol. „An einer Stelle eigenartige Zapfenbildung“).

H. V. am 29. II. 1936: 2,5 %.

2 Geschwister des Vaters an Krebs gest. Röntgenbestrahlung als Portio-Ca.

67) Frau M. K., 58 J.

Diagnose: Ringulkus.

H. V. am 10. III. 1937: 0,2 %!

Vater mit 63 J. an Magenkrebs gest.

86) Frau M. O.: 48 J.

Diagnose: Klim. Metrorrhagien, Portioerosion.

H. V. am 2. IV. 1936: 2,3 % und 2,8 %.

106) Frau K. S., 72 J.

Diagnose: Stauungsblutung im Klimakterium.

H. V. am 28. IV. 1936: 2 % und 2 %.

Vater an Magenkrebs, Schwester an Unterleibskrebs gestorben.

114) Frau M. S., 45 J.

Diagnose: Klim. Metrorrhagien.

H. V. am 29. VII. 1936: 1,2 %.

Vater an Magenkrebs gestorben.

Der Fehlerprozentatz bei meinen Carcinom-freien Fällen ist also 18,7. Sehrt gibt sie bei seiner Indophenolblau-Sauer-

stoffreaktion an mehreren hundert Untersuchten mit etwa 12% an. Mit dem Hämatin-Verzug wird er bei seinen Untersuchungen wohl ähnliche Zahlen erhalten haben. Höring und Schmid geben als Resultat ihrer Überprüfung der Sehrtschen Indophenolblau-Sauerstoffreaktion bei Krebsfreien 48,5% positive Resultate an.

Diese Krebsergebnisse beim Normalen aber sind es gerade, woran die Carcinom-Reaktionen bisher krankten. So finden sich bei den physikochemischen Methoden durchschnittlich 51,7%, bei der Komplementbindungsreaktion 11,6%, bei der zytolytischen Methode 11,7%, bei der Cutanreaktion 16,8% und mit der Fuchs'schen Methode 5-10% solcher positiven Fälle. Sehrt findet eine auffallende Ähnlichkeit des Durchschnitts dieser Zahlen mit der Mortalität an Krebs, die um 12% liegt. Er glaubt daher annehmen zu dürfen (wenigstens für die Indophenolblau-Sauerstoffreaktion), daß die positiven Resultate beim Normalen eine gewisse Carcinomdisposition bedeuten, vor allem, da sich, infolge der Vererbungsneigung des Carcinoms, bei Nachkommen von Krebskranken in 80% eine positive Reaktion zeigte.

Es ist klar, daß nicht alle von diesen Disponierten erkranken, denn wir verlangen als Voraussetzung für das Auftreten der Krebskrankheit ja auch noch den locus minoris resistentiae und die auslösende Ursache; außerdem stirbt auch ein Teil von ihnen an einer anderen Krankheit, bevor das Carcinom zum Ausbruch kommt.

Aus dieser vererbten Carcinomdisposition erklärt sich vielleicht auch der hohe Fehlerprozentatz von 18,7 bei den von mir untersuchten Krebsfreien. Finden sich doch unter den 7 klinisch Carcinom-Freien mit positivem Hämatin-Verzug nicht weniger als 5, die eine Krebsvorbelaftung durch die nächsten Blutverwandten sicher angeben können. Bei solchen Kranken wäre der Hämatin-Verzug noch ein zweites, eventuell ein drittes Mal anzustellen. Ist dann das Ergebnis wiederum eindeutig positiv, vielleicht auch die durchgeführte Indophenolblau-Sauerstoffreaktion, so sind die Patientinnen unter genauester Kontrolle zu halten. Erst der weitere Verlauf wird dann zeigen, ob das Ergebnis der Reaktion richtig oder falsch war, ob der Fall zu Gunsten oder zu Lasten der Methode zu buchen ist. Bei den 31 Krebs-

freien mit richtigem Ergebnis waren allerdings auch 3, bei denen 1 Elternteil an einem Carcinom verstorben war (1 Sterilität, Hämatin-Verzug 3,8%, 2 Parametritis, Hämatin-Verzug 5,4%; 6,9%). Im übrigen ist die Zahl der von mir untersuchten krebsfreien Fälle wohl doch viel zu klein, um eine wesentliche Prozentzahl errechnen oder sonst über das schwierige Kapitel positive Krebsreaktion beim Normalen und Carcinom-Disposition etwas feststellen zu können.

In all seinen Arbeiten über seine Krebsreaktionen betont Sehrt immer wieder, daß diese geradezu berufen seien, den einzusetzen, wo der Pathologe und der Kliniker mit den bisherigen Untersuchungsmöglichkeiten trotz größter Bemühungen nicht mehr recht weiter kommt, nämlich bei der Frühdiagnose und in allererster Linie mit dem Erkennen des latenten Krebses. Gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, daß nicht etwa der positive Ausfall einer der beiden Reaktionen nun einen latenten Krebs anzeigt, sondern, daß in solchen Fällen dann immer erst noch eine Untersuchung mit der anderen Methode — dem Hämatin-Verzug bzw. der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion — anzustellen sei. So findet der zunächst anzuwendende (einfache durchzuführende) Hämatin-Verzug in der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion seine ideale Ergänzung.

Von meinen 209 Untersuchungen stehen jetzt noch 8 Fälle aus. Zunächst 4 Sarkome:

9a) Frau L. B., 62 J.

Diagnose: Sarkom der linken Thoraxseite.

H. V. am 19. 6. 1937: 1,6 %.

23) Frau B. D., 51 J.

Diagnose: Operiertes Sarkom der linken Beckenschaukel.

H. V. am 29. 7. 1936: 1,8 %.

91) Frau M. P., 56 J.

Diagnose: Riezenzellen-Sarkom des Uterus.

H. V. am 12. 12. 1935: 3,3 % und 6,8 %.

92) Frau M. W., 37 J.

Diagnose: Sarkom der linken Halsseite. Klinisch rezidiv- und metastasenfrei!

H. V. am 30. 7. 1936: 3,9 %.

Der dritte Fall wäre als Fehler zu werten, die anderen 3 als Treffer. Diese 4 untersuchten Sarkome berechtigen jedoch noch nicht zu irgendwelchen Folgerungen. Übrigens hat auch Sehrt in seinen Veröffentlichungen noch nicht über Erfahrungen mit dem Hämatin-Verzug bei Sarkomen berichtet.

4 Fälle nach Gravidität:

6b) Frau B. B., 28 J.

Diagnose: Eihautretention. Spontangeburt am
9. 5. 1936. Seitdem Dauerblutung.

H. V. am 18. 6. 1936: 4,2 %.

93a) Frl. A. R., 23 J.

Diagnose: Abort. incomplet. (vor einigen Tagen).

H. V. am 18. 3. 1937: 2,5 %.

109a) Frau A. S., 34 J.

Diagnose: Abort. incomplet.

Vom 26. 3.—12. 4. 37 Dauerblutung.

H. V. am 16. 4. 1937: 3,3 %.

117) Frau A. S., 36 J.

Diagnose: Abortus mens III.

Am Vortag Ausräumung in Evipan.

H. V. am 5. 12. 1935: 3,3 %.

In einer Mitteilung über Untersuchungen der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion im Schwangeren-Venenblut (22) bestätigt Michaelis die Tatsache der positiven Indophenolblau-Sauerstoffreaktion bei der Gravidität. Er gibt an, daß diese erhöhten Blauwerte ungefähr 2 Wochen nach Ablauf der Schwangerschaft (gleichgültig, ob frühzeitig oder normal) noch bestanden, und erst nach etwa 3—4 Wochen zur Norm abfielen.

Ebenso, wie bei der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion im Krebskrankenblut und im Schwangeren-Venenblut eine erhöhte Blaubildung stattfindet, zeigt sich, wie schon eingangs erwähnt, eine verzögerte Hämatinbildung auch im Blutfarbstoff der Graviden. Allerdings sind diese Nachdunkelungswerte etwas höher als beim Carcinom, also näher an der Grenze zum Normalen.

Von den hier vorliegenden 4 Fällen ist der vierte durch die am Vortage vorgenommene Ausräumung in Evipannarkose als gestört zu betrachten.

Nr. 93a): Der Hämatin-Verzug ergibt einige Tage nach dem Abort den richtigen positiven Wert.

Nr. 109a): Der Hämatin-Verzug ist etwa 3 Wochen nach Abgang der Frucht negativ, liegt an der Grenze des Normalen.

Nr. 6b): 5 Wochen nach Spontangeburt ist der Hämatin-Verzug wieder normal geworden.

Interessant ist ein Vergleich des von mir untersuchten Hämatin-Verzugs bei 38 histologisch sicheren Carcinomen mit der gleichzeitig angestellten (maximal ein Unterschied von einigen Tagen) Klein'schen Krebsreaktion, die zu jener Zeit hoch im Kurs stand. Dabei hatte der Sehrt'sche Hämatin-Verzug 28 Treffer, 2 Fehler und 8 gestörte Fälle. Die Klein-Reaktion wies 20 Treffer, 13 Fehler und 5 Störer auf. Die höhere Störerszahl bei der Sehrt-Reaktion ist damit zu erklären, daß ein Großteil dieser Fälle aus der Anfangszeit meiner Untersuchungen stammt, in der ich — wie früher erwähnt — die nach Sehrt's Angaben gestörten Fälle noch nicht grundsätzlich ausschloß.

Nach Abschluß meiner Untersuchungen noch eine Betrachtung über die Wertigkeit des Hämatin-Verzugs als Krebsdiagnostikum, über seine Mängel und Qualitäten. Schon die einfache technische Durchführung des Hämatin-Verzugs schließt ihre gewissen Nachteile in sich. Durch die Augenkolorimetrie ist sie jedem mit dem Autenrieth-Königsberger'schen Hämoglobinomometer — eine in ihrer leichten Bedienungsweise geradezu primitiv zu bezeichnende Apparatur — möglich, doch ist, wie ich an mir selbst feststellen konnte, eine genaue und lange Übung des Auges nötig, bis wirklich einwandfreie Ablejungen gemacht werden können. Andererseits sind mir auch gegen Ende meiner Untersuchungen, nach über 2000 durchgeführten Ablejungen, gelegentlich Blutproben vorgekommen, bei denen ich mir über die Helligkeitsgleichheit der beiden Vergleichsflüssigkeiten nicht ganz klar werden konnte. Jedenfalls ist es unangenehm, wenn sich solche Fälle gerade um den Grenzwert bewegen. Außerdem bedeutet, wie auch Sehrt angibt, die wechselnde Helle des Tageslichts eine weitere Erschwerung.

Der Autor hat daher schon gegen Ende des Jahres 1935 begonnen, in Gemeinschaft mit der Firma Hellige, Freiburg,

eine Apparatur auszuarbeiten, in der „unter besonderer Sicherung der absoluten Gleichmäßigkeit der Lichtquelle, das Licht einer Glühbirne eine mit salzsaurem Hämatin gefüllte Küvette durchsetzt und auf eine Sperrschicht-Photozelle trifft, wo es eine mit der Intensität des Lichtes an- oder absteigende Spannung bzw. einen entsprechenden elektrischen Strom erzeugt, der mit einem Galvanometer registriert wird“. (Sehrt: M. m. W. 1935, 2074). Die Ableasuren wurden dann mehrmals in gewissen Abständen vorgenommen und die Ergebnisse auf Kurven übertragen, in denen so der Grad der Nachdunkelung der Hämatin-Suspension, wie auch der Verlauf derselben aufgezeichnet wurde. Für den Praktiker beabsichtigte die Firma Hellige als weitere Vereinfachung einen automatisch registrierenden Apparat herzustellen. Der Vertrieb der Photozellen-Apparatur wurde jedoch bald wieder gestoppt, da sie sich als noch verbesserungsbedürftig erwies. Zweifellos würde sie eine weitere Erleichterung für die Durchführung des Hämatin-Verzugs bedeuten. Doch bietet hier die Umsetzung in die Wirklichkeit wohl wesentlich mehr Schwierigkeiten, als es die Theorie in der obigen Erklärung Sehrt's zunächst erwarten läßt. Sicherlich hätte auch die Firma Hellige, die wegen ihrer Herstellung von Qualitätsapparaten bekannt ist, längst derartige Apparate in den Handel gebracht, wenn sich nicht immer wieder Unzulänglichkeiten in der Versuchsanordnung, besonders an der das menschliche Auge ersetzenden Photozelle (wie die Hersteller mitteilten), ergeben hätten. Immerhin wurden seither unter Mitarbeit des Direktors des Freiburgers Physikalischen Instituts weitere theoretische und praktische Erfahrungen gesammelt, deren Ergebnisse demnächst veröffentlicht werden sollen.

Ist diese neue, objektiv arbeitende Apparatur jedoch einmal erstellt, so ist es zunächst daran, sie in Krankenhäusern an einer möglichst großen Zahl von Krebskranken und Krebsfreien zu erproben. Denn bevor solch ein Hilfsmittel dem in diesem Fall nur, und zwar absolut berechtigt, kritisch eingestellten praktischen Arzt übergeben wird, muß es wirklich hieb- und stichfest sein. Die Apparatur, wie sie bisher vorliegt und mir zu meinen Untersuchungen diente, also die augenkolorimetrische Messung, wird sich jedenfalls im Sprechzimmer des Arztes noch nicht bewähren. Versetzen wir uns doch in die Lage des gehezten Kassenarztes,

die auch wir Kliniker zum großen Teil aus eigenen Erfahrungen kennen. Einmal benötigt die exakte Nachprüfung selbst für den geübten Untersucher, mit je 4 Ableisungen nach der 5. und 47. Minute, abgesehen von Entnahme und Vermischen des Blutes, einen Zeitaufwand von sicherlich 15 Minuten, was für den vielbeschäftigten Arzt schon etwas zu bedeuten hat. Verlangt man nun noch von ihm ein Üben des Auges im Vergleichen der beiden Helligkeitsgrade an vielen hundert Ableisungen, bis er darin einigermaßen sicher und zuverlässig und so zur Durchführung des Hämatin-Verzugs fähig geworden ist, so ist das eine nahezu unmögliche Forderung.

Immerhin wird in einem Klinikbetrieb das Ergebnis des Hämatin-Verzugs, wenn dieser von einem geübten und gewissenhaften Untersucher nachgeprüft wurde, die Indikationsstellung schon in einem gewissen Maße beeinflussen können. Tritt z. B. bei Verdacht auf Vorliegen eines Ovarial-Carcinoms im Blute der Untersuchten eindeutig ein Hämatin-Verzug zutage, eventuell auch bei einer zweiten Kontrolle, so wird sich der Gynäkologe leichter als ohne diese Unterstützung zu einer Laparotomie entschließen. Anders ist es bei negativem Ausfall der Reaktion. Hier wäre das Ergebnis zumindest noch ein zweites, eventuell ein drittes Mal zu untersuchen, außerdem das klinische Bild vorsichtigst abzuwägen und weiter zu beobachten. Jedenfalls schließt auch ein negativer Hämatin-Verzug nie das Vorliegen eines Carcinoms aus.

Und rückblickend das Resultat dieser Untersuchungen. Das Phänomen des Hämatin-Verzugs ist in der Klinik bei exakter Durchführung ein gewisser Hinweis auf eine Krebserkrankung im Körper. Sie ist jedoch nicht als selbständiges Kriterium anzusehen, sondern nur in Verbindung mit klinischer Untersuchung und Beobachtung zu verwerten.

Als Abschluß dieser Betrachtungen noch einige kritische Sätze über den Begriff „Krebsreaktion“, die Sehrt an das Ende seiner Abhandlung über „die Erkennbarkeit des offenbaren und des verborgenen Krebsleidens“ in der M. m. W. 1935, S. 615 setzt:

„Betrachten wir zum Schluß die Bindungsfähigkeit der klinischen Laboratoriumsmethodik an sich, so gibt es keine einzige Methode, die für sich allein, d. h. ohne Zusammenhang mit der

ein klinischen Untersuchung eine Entscheidung bringen kann und auch je bringen wird. Wie der Typhusbazillennachweis und der Cholerabazillennachweis im Stuhl niemals an sich die Krankheit bedeutet, wie der Nachweis von Blut im Stuhl theoretisch angehen noch nicht einmal sicher die Gruppe Ulcus-Carcinom bedeutet, wie der positive Ausfall der Wassermann'schen, der Ascheim-Zondekreaktion niemals an sich die betreffende Erkrankung oder Schwangerschaft anzeigen kann, da beide Reaktionen bei so und sovielen anderen Verhältnissen auch vorkommen können, so wird auch jegliche Krebsdiagnose aus Serum oder Blut nur im Zusammenhang mit der klinischen Beobachtung verwendbar sein.

Im übrigen wird die Zeit entscheiden, welche krebsdiagnostische Methode die Führung allein oder zusammen mit einer zweiten übernehmen wird. Letzten Endes kommt es auch hier auf die praktische Leistung an, besonders beim latenten Carcinom. — Hingegen sind die Prozentzahlen in der Forschung, darauf muß endlich einmal für die medizinische Wissenschaft hingewiesen werden, mehr und viel weitgehender als Analogie und Erfahrung nur Krücken unserer Urteilskraft.“

Zusammenfassung:

Die von Sehrt angegebene Methode der Hämatin-Verzugsprüfung wurde an dem Material der Univ.-Frauen-Klinik Erlangen in 209 Fällen mit folgenden Resultaten überprüft:

1. Verwertbar waren 163 Fälle. Diese verteilten sich folgendermaßen:

110 Krebskranke 91,8% Treffer

15 rezidivfreie Krebskranke 86,7% Treffer

38 ohne klinisch nachweis-

bares Carcinom . . . 81,6% Treffer.

Das gibt einen Gesamt-Trefferprozentatz von 86,7.

2. In das Gesamtmaterial nicht eingerechnet sind folgende Fälle:

26 gestörte Blutproben. Bei ihrer Untersuchung ergab sich Übereinstimmung mit den von Sehrt angegebenen Störfaktoren bis auf einen Punkt. Von 9 Krebskranken, die einige Stunden bis 2 Tage vor der Blut-

untersuchung einer Röntgentiefenbestrahlung unterzogen worden waren, zeigten 8 trotzdem einen positiven Hämatin-Verzug, also Krebswerte.

Bei 12 Fällen konnte die klinische Diagnose Carcinom histologisch nicht gesichert werden.

Ergebnis: 11 Treffer. 1 Fehler

4 Sarkome: 3 Treffer. 1 Fehler

1 Gravidität und 3 Aborte: 3 Treffer. 1 Störer.

Zur Wertigkeit der Methode.

Die ausnehmend einfache Apparatur, die zur Reaktion benötigt wird, wie auch die jedem mögliche Art, sie durchzuführen, schließen subjektive und objektive Mängel in sich. Jedenfalls ist die augencolorimetrische Messung in der Sprechstunde des Arztes noch nicht verwendbar. Die Firma Hellige in Freiburg will eine Photozellenapparatur zur Messung des Hämatin-Verzugs konstruieren, in der das subjektiven Fehlern unterworfenen Auge durch eine Photozelle ersetzt werden soll; zweifellos ein Fortschritt in der Methodik. Doch auch dieser Apparat muß, bevor er der Ärzteschaft übergeben wird, erst noch genauestens in den Kliniken untersucht werden.

Unzweifelhaft ist der Hämatin-Verzug ein weiterer Baustein auf dem schwierigen Wege zur Krebserkennung. Mit seiner bisherigen Methodik gehört er jedoch zunächst nur in den klinischen Betrieb, wo er neben Untersuchung und Beobachtung des Kranken zur Sicherung der Diagnose beitragen kann.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Wintz für die Überlassung des Themas und seine freundlichen Ratschläge herzlichst zu danken. Ferner danke ich Herrn Dr. Mühlhäuser für seine freundlichen Anregungen und Hinweise, die er mir im Laufe der Arbeit gegeben hat.

Literatur:

1. Sehrt, Die Indophenolblau-Sauerstoffreaktion beim Krebskranken. Klinische Wochenschrift 1935, 19.
 2. Sehrt, Die Methodik der Indophenolblau-Sauerstoffreaktion beim Krebskranken. Zbl. Chir. 1935, 613.
 3. Michaelis, Die Indophenolblau-Sauerstoffreaktion beim Gebärmutterkrebs. Zbl. Gyn. 1935, 1409.
 4. Sehrt, Der Blutfarbstoff des Krebskranken. Münchn. med. Wochenschrift 1935, 624.
 5. Sehrt, Die Erkennbarkeit des offenbaren und des verborgenen Krebsleidens. Münchn. med. Wochenschrift 1935, 615.
 6. Sehrt, Eine neue Methode der Sauerstoff-Bestimmung des menschlichen Blutes mittels Indophenolblau und die mit dieser Methode erhobenen Befunde beim Krebskranken und Krebsdisponierten. Z. Krebsforschg. 30, 260 (1930).
 7. Sehrt, Die Erkennbarkeit der Krebserkrankung durch die photometrische Messung des Venenblutes. Z. Krebsforschg. 37, 94 (1932).
 8. Sehrt, Zur Frühdiagnose des Krebses. Münchn. med. Wochenschrift 1935, 2074.
 9. Michaelis, Neuere Feststellungen über Eigentümlichkeiten des Schwangeren-Venenblutes. Zbl. Gynäk. 1934, 1270.
 10. Höring, F. O. und U. Schmid, Die Krebsreaktion nach Sehrt. Münchn. med. Wochenschrift 1936, 2001.
-

Lebenslauf.

Ich bin am 11. Mai 1910 in Rosenberg/Opf. als Sohn des Reichsbahnoberinspektors Adolf Sametjchek und seiner Ehefrau Anna, geb. Schneider, geboren. In den Jahren 1916—1920 besuchte ich die ersten vier Klassen der Volksschule in Neukirchen/Opf., von 1920—1923 die drei untersten Klassen des humanistischen Gymnasiums in Weiden/Opf. Durch die Versetzung meines Vaters nach Erlangen kam ich an das hiesige Gymnasium, wo ich im Februar 1929 die Reifeprüfung ablegte.

An der Erlanger Hochschule begann ich das Studium der Rechte, sattelte jedoch nach 1 Semester auf Medizin um. Im März 1931 bestand ich in Erlangen die ärztliche Vorprüfung. Während des W.S. 1932/33 hörte ich an der Innsbrucker Universität und ging im S.S. 1933 zur Fortsetzung meines Studiums wieder nach Erlangen zurück.

Im Frühjahr 1935 bestand ich in Erlangen das Medizinische Staatsexamen. Vom 23. Juli 1935 bis 19. Januar 1936 war ich an der Erlanger Frauenklinik als Medizinal-Praktikant tätig. Dort gab mir für meine Doktorarbeit Herr Professor Wintz das Thema: „Über die krebsdiagnostische Verwertbarkeit des Hämatin-Verzugs“.

Nach einer Medizinal-Praktikantentätigkeit an der Medizinischen Klinik vom 20. Januar 1936 bis 25. Mai 1936 war ich an der Chirurgischen Klinik tätig.

Seit dem 24. Juni 1936 bis heute bin ich an der Universitäts-Frauenklinik in Erlangen beschäftigt.



